



Fentanyl Information for Families

What is Fentanyl?

Fentanyl is a powerful synthetic opioid that is 50-100x more powerful than morphine. Fentanyl is cheap to make and is often cut into other drugs, including a variety of pills, cocaine and meth. Learn more [here](#).

Possible Signs of Use

- Pinpointed pupils
- Slurring Words
- Frequently tired, sleeps often (hard to wake)
- Secrecy
- Possessive of backpack, room, etc.
- Possessive of phone/social media
- Often sick
- Stomach problems
- Increased irritability, agitation
- Sudden weight loss
- Changes in appetite

Signs of an Overdose

- Face/skin becomes extremely pale and/or feels clammy to the touch
- Body goes limp
- Fingernails or lips have a purple or blue color
- Vomiting or gurgling noises
- Cannot be awakened or are unable to speak
- Breathing or heartbeat slows or stops

If you suspect that someone is experiencing an overdose, call 911, [administer Narcan](#), and remain with the person until help arrives.

Myths

- You can't overdose from [just touching it](#); fentanyl must be introduced into the bloodstream or a mucus membrane in order for someone to feel the effects.
- There are no reports of it being [found in cannabis](#).

Resources

- ❑ [Tips for How to Talk to Your Kids about Fentanyl](#)
- ❑ Order Free Narcan and Fentanyl Testing Strips from the City of Denver [Here](#)
- ❑ [How to Use Narcan](#)
- ❑ DPS Prevention Services Webinar: [What Parents Need to Know About Drug Overdose Prevention](#)
- ❑ [Fentanyl Fact Sheet](#)
- ❑ [Adolescent Substance Use Treatment Providers](#)
- ❑ [The Drug Policy Alliance Website](#): Information on how to facilitate a real and factual conversation with your teen



Información para las familias sobre el fentanilo

¿Qué es el fentanilo?

El fentanilo es un fuerte opioide sintético cuya potencia es entre 50 y 100 veces superior a la morfina. Fabricar fentanilo es barato y a menudo se añade a otras drogas, incluyendo una variedad de pastillas, cocaína y metanfetamina. Pueden obtener más información [aquí](#).

Posibles señales de su uso

- Pupilas contraídas
- Arrastrar las palabras
- Cansancio frecuente, dormir a menudo (difícil de despertar)
- Secretismo
- Mostrarse posesivo de la mochila, de la habitación, etc.
- Enfermarse a menudo
- Problemas de estómago
- Aumento de la irritabilidad, agitación
- Pérdida repentina de peso
- Cambios en el apetito
- Mostrarse posesivo del teléfono/redes sociales

Señales de sobredosis

- La cara/piel se vuelve sumamente pálida y/o se siente fría y húmeda al tocarla
- Cuerpo flácido
- Las uñas o los labios presentan un color morado o azulado
- Vómitos o gorgoteos
- No puede despertarse o no puede hablar
- La respiración o frecuencia cardíaca es lenta o para

Si sospecha que alguien está sufriendo una sobredosis, llame al 911, [administre Narcan](#) y permanezca con la persona hasta que lleguen los servicios de auxilio.

Mitos

- No se puede sufrir una sobredosis con tan [solo tocarlo](#); el fentanilo debe introducirse en la sangre o en las membranas mucosas para que alguien sienta sus efectos.
- No se ha informado de su [presencia en el cannabis](#).

Recursos

- ❑ [Consejos sobre cómo hablar con sus hijos sobre el fentanilo](#)
- ❑ Pida a la Ciudad de Denver Narcan y tiras para analizar la presencia de fentanilo [aquí](#)
- ❑ [Cómo usar Narcan](#)
- ❑ Seminario web de los Servicios de Prevención de las Escuelas Públicas de Denver: [Lo que los padres necesitan saber acerca de la prevención de sobredosis de drogas](#)
- ❑ [Hoja informativa sobre el fentanilo](#)
- ❑ [Proveedores de tratamiento en torno al uso de sustancias en adolescentes](#)
- ❑ [Sitio web The Drug Policy Alliance](#): Información para facilitar una conversación real y objetiva con su hijo adolescente



DENVER
PUBLIC
SCHOOLS

Substance Use Prevention Program

Empowering Healthy Choices